

Paru aux éditions EDILIVRE (France)

**GESTION DES ANTIRETROVIRAUX :
CONSOMMATION, OBSERVANCE ET EFFETS
INDESIRABLES CAS DE LA FORMATION
SANITAIRE URBAINE A BASE
COMMUNAUTAIRE ABOBO AVOCATIER**

Par **BENIE BI TAH APOLLINAIRE**


**RETROUVEZ CI-DESSOUS QUELQUES EXTRAITS DE
L'OUVRAGE**

Tableau V : Répartition des patients selon la situation matrimoniale et le sexe

	HOMMES	FEMMES	TOTAL
Marié(e)	03(9,68%)	09(6,67%)	12 (7,23%)
En couple	15(48,39%)	58(42,96%)	73 (43,98%)
Célibataire	12(38,71%)	56(41,48%)	68 (40,96%)
Veuf (Ve)	01(3,22%)	12(8,89%)	13 (7,83%)
TOTAL	31(100%)	135(100%)	166 (100%)

La majorité de la population était mariée ou en couple (85 personnes soit 51,20%).

N=166



● Non scolarisé

● Secondaire

● Primaire

● Supérieur

Figure 5 : Répartition des patients selon le niveau d'instruction.

Les non scolarisés et primaire représentaient 64% de la population.
Dans la population féminine, les non scolarisées et primaires
représentaient **68,89%** contre **41,93%** des hommes.

IV-3- DONNEES DE L'OBSERVANCE

.....en effet, les moins instruits accepteraient plus facilement leur maladie et deviendraient plus réceptifs aux recommandations du personnel de santé estimé qualifier pour améliorer leur bien-être. Le secret de la maladie rendrait également les malades plus observants ; afin d'éviter d'attirer les soupçons de leur entourage. En revanche, lorsque l'information est révélée le patient se sentant libéré de sa contrainte serait moins observant.

On comprend dès lors l'importance de la relation Médecin-Patient, la relation équipe de soin-patient et surtout l'importance de développer les groupes de soutien des personnes vivant avec le VIH/SIDA [14] dans les centres de prise en charge afin d'améliorer le niveau et la qualité de l'observance. En effet, à travers les conseils et les encouragements du.....

IV-4- DONNEES DE TOLERANCE (EFFETS INDESIRABLES)

Les effets indésirables dominants sous ces deux régimes étaient neurologiques (vertiges, céphalées) et digestifs (nausées, vomissements)..... Qu'il s'agisse des patients sous TDF+3TC+EFV ou des patients sous AZT+3TC+LPV/r, on constatait que les effets indésirables étaient plus marqués chez les femmes que chez les hommes.

Cela corrobore les résultats de l'étude réalisée par Marilou GAGNON [12], Dans ses recherches sur les effets indésirables du VIH chez les PVVIH, Marilou GAGNON a observé une prédominance des effets indésirables chez les femmes que chez les hommes. En effet, selon

Collectif Femmes et VIH [2] si plus de 50% des personnes vivant avec le VIH sont des femmes, elles ne pèsent que 15 à 20% dans la recherche en particulier dans les essais thérapeutiques.....

On ne peut pas conclure que l'alimentation éviterait la survenue des effets indésirables chez les patients sous TDF+3TC+EFV. L'impact de l'alimentation sur le TDF-3TC-EFV serait variable. Cela pourrait s'expliquer par la présence simultanée à l'intérieur de cette combinaison de deux principes actifs qui se prennent avec un repas (TDF et 3TC) et d'un troisième qui se prend de préférence à jeun (EFV).....

En effet, si le tenofovir et la lamudivine peuvent être pris avec un repas ce n'est pas le cas de l'efavirenz qui se prend à jeun donc loin des repas et au couché. Par contre chez les patients sous AZT-3TC-LPV/r l'alimentation protégerait de la survenue des effets indésirables.

Notre résultat confirme celui de CRITON [7]. L'alimentation jouerait un rôle capital dans l'observance aux traitements antirétroviraux. Elle ajoute aussi que 2 litres d'eau par jour sont conseillés pour aider l'organisme à métaboliser correctement le médicament pour éviter la survenue des effets indésirables.....

IV-5- DONNEES DE GESTION

IV-5-1- Commande et livraison des ARV

Cette étude révèle que les taux de satisfaction des commandes étaient souvent faibles ou nuls (produits commandés, mais non livrés). Ce qui pourrait être un facteur supplémentaire d'inobservance des patients.

Le centre avait régulièrement passé ses commandes de TDF-3TC-EFV. Malgré cela, les livraisons n'avaient pas été faites régulièrement. En plus le taux de satisfaction dans la majorité des cas était resté bas.....

**RETROUVEZ L'INTEGRALITE DE L'OUVRAGE
(INTRODUCTION, GENERALITE, RESULTATS,
DISCUSSION, CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS)
EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS :**

<https://www.edilivre.com/memoire-gestion-des-antiretroviraux-consommation-observance-et-e.html>

Ou en allant sur le site : [edilivre.com](http://www.edilivre.com)